

Обследование на ВИЧ:

1. Анонимный кабинет (кабинет № 109) находится на 1-ом этаже поликлиники Центра СПИД, по адресу: наб. Обводного канала, д. 179.
Часы работы кабинета № 109
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00.

2. Районные филиалы центра СПИД Фрунзенский

Городская поликлиника № 109
ул. Олеко Дундича, д. 8, каб. 141
тел.: +7 (812) 778-98-12

Колпино

Городская поликлиника № 95
ул. Машиностроителей, д. 10, каб. 314
тел.: +7 (812) 481-33-72

Московский

Городская поликлиника № 48
ул. Благодатная, д. 18

Василеостровский

Городская поликлиника №3
3-я линия В.О., д. 50 каб. 34
тел.: +7 (812) 323-39-47

Калининский

Городская поликлиника №112
ул. акад. Байкова, д. 25, каб. 142
тел.: +7 (812) 555-43-56

Красногвардейский

Городская поликлиника №107
ул. Коммуны, д. 34, 2-й этаж
тел.: +7 (812) 520-20-06

3. Анонимный кабинет Больницы Боткина

ул. Миргородская 3, здание поликлиники.

4. Анонимный кабинет областного Центра СПИД

ул. Мира 16, 2-ой этаж. Отдел профилактики тел.: +7 (812) 456-08-64

5. Позитивный диалог (МСМ)

ул. Миргородская 3 кор. 2 офис 34
тел.: +7 (812) 717-89-90,
+7 (904) 616-46-97

6. НП «Е.В.А» тел.: +7 (921) 913-03-04

7. БФ «Диакония»тел.: +7 (812) 916-92-24

8. БФ «Гуманитарное Действие»


- горячая линия проекта по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию: тел.: +7 (952) 362-90-68
- горячая линия проекта по снижению вреда (обмен шприцев, презервативы, налоксон) тел.: +7 (952) 362-87-85

**Группа взаимопомощи «Свеча»
для ВИЧ+:
по субботам с 16-00 до 20-00,
ул Б. Подъяческая д. 34
+7 (921) 932-34-47**

Предупрежден, значит вооружен!



Брошюра предназначена исключительно
для потребителей инъекционных наркотиков




Если пользоваться нестерильным инструментарием, будь то шприцы или ёмкости, можно заразиться как ВИЧ-инфекцией, так и вирусными гепатитами



Промывания водой, перекисью водорода, хлоргексидином и прочими жидкостями не спасут от заражения, инструментарий должен быть стерильным, а значит новым.




Шприц можно прокипятить. Кипятить инструмент нужно не менее 15 минут



Если не использовать презерватив во время половых контактов, можно заразиться ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами, а так же инфекциями, передающимися половым путем (например сифилис)



Использование хлоргексидина и мирамистина после половых контактов не защищает от заражения.



Использованные шприцы можно поменять на новые в автобусе БФ «Гуманитарное действие»

Брошюра создана ПЦБФ «Свеча» по заказу СПб ГБУЗ «Межрайонный Наркологический Диспансер №1» в рамках реализации государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции при участии СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Все права защищены.

Воспроизведение, передача, и дублирование любой части содержащихся в публикации материалов допускается при условии их некоммерческого использования в дальнейшем. Ссылка на СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и СПб ГБУЗ «Межрайонный Наркологический Диспансер №1» обязательна.

Автор текста и редактор: Зингер Е. Е.
Дизайн и верстка: Яковлева М. В.